

Für die BMS CAR-T-Zelltherapien qualifizierte Zentren

Stand: September 2023



Bundesland	Ort	Zentrum	Indikation
Baden-Württemberg	Freiburg	Universitätsklinikum Freiburg	r/r MM r/r DLBCL
	Heidelberg	Universitätsklinikum Heidelberg	r/r MM r/r DLBCL
	Stuttgart	Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart	r/r MM r/r DLBCL
	Tübingen	Universitätsklinikum Tübingen	r/r MM r/r DLBCL
	Ulm	Universitätsklinikum Ulm	r/r MM r/r DLBCL
Bayern	Erlangen	Universitätsklinikum Erlangen	r/r MM r/r DLBCL
	München	Klinikum der Universität München	r/r MM r/r DLBCL
	München	Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München	r/r MM r/r DLBCL
	Regensburg	Universitätsklinikum Regensburg	r/r MM r/r DLBCL
	Würzburg	Universitätsklinikum Würzburg	r/r MM r/r DLBCL
Berlin	Berlin	Helios Klinikum Berlin-Buch	r/r MM r/r DLBCL
Hamburg	Hamburg	Asklepios Klinik St. Georg	r/r MM
Hessen	Frankfurt	Universitätsklinikum Frankfurt	r/r MM r/r DLBCL
	Marburg	Universitätsklinikum Gießen und Marburg	r/r MM
Niedersachsen	Göttingen	Universitätsmedizin Göttingen	r/r MM
	Hannover	Medizinische Hochschule Hannover (MHH)	r/r MM r/r DLBCL
Nordrhein-Westfalen	Bochum	Universitätsklinikum Knappschafts-Krankenhaus Bochum	r/r MM r/r DLBCL
	Bonn	Universitätsklinikum Bonn	r/r MM r/r DLBCL
	Düsseldorf	Universitätsklinikum Düsseldorf	r/r MM r/r DLBCL
	Essen	Universitätsklinikum Essen	r/r MM r/r DLBCL
	Köln	Universitätsklinikum Köln	r/r MM r/r DLBCL
	Münster	Universitätsklinikum Münster	r/r MM r/r DLBCL
Rheinland-Pfalz	Mainz	Universitätsmedizin Mainz	r/r MM r/r DLBCL

Für die BMS CAR-T-Zelltherapien qualifizierte Zentren

Stand: September 2023



Bundesland	Ort	Zentrum	Indikation
Sachsen	Chemnitz	Klinikum Chemnitz	r/r MM r/r DLBCL
	Dresden	Universitätsklinikum Carl Gustav Carus	r/r MM r/r DLBCL
	Leipzig	Universitätsklinikum Leipzig	r/r MM r/r DLBCL
Sachsen-Anhalt	Magdeburg	Universitätsklinikum Magdeburg	r/r MM r/r DLBCL
Schleswig-Holstein	Kiel	Universitätsklinikum Schleswig-Holstein	r/r MM r/r DLBCL
Thüringen	Jena	Universitätsklinikum Jena	r/r MM r/r DLBCL

Indikation r/r MM: ABECMA® wird angewendet zur Behandlung des rezidierten und refraktären Multiplen Myeloms (r/r MM) bei erwachsenen Patient:innen, die mindestens drei vorausgegangene Therapien, einschließlich eines Immunmodulators, eines Proteasominhibitors und eines Anti-CD38-Antikörpers, erhalten und unter der letzten Therapie eine Krankheitsprogression gezeigt haben.¹

Indikation r/r DLBCL: BREYANZI® wird angewendet zur Behandlung des rezidierten oder refraktären diffus großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL), primär mediastinalen großzelligen B-Zell-Lymphoms (PMBCL) und follikulären Lymphoms Grad 3B (FL3B) bei erwachsenen Patienten nach zwei oder mehr Linien einer systemischen Therapie.²

1. Fachinformation ABECMA®. Aktueller Stand.
<https://fi.b-ms.de/Abecma>



2. Fachinformation BREYANZI®. Aktueller Stand.
<https://fi.b-ms.de/Breyanzi>

